



**Processo Seletivo**  
**Residência Multiprofissional e em**  
**Área Profissional em Saúde 2014**

**CADERNO DE PROVA**

Dia: 02 de fevereiro de 2014

---

Prova: **16-Enfermeiro - Saúde da Mulher, com ênfase em Obstetria - Hospital Maternidade Petronila Campos/São Lourenço da Mata**

---

***Leia com atenção:***

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e, quando for autorizado pelos fiscais de sala.
02. Confira seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. A prova terá duração de 3 horas; O(a) candidato(a) só poderá ausentar-se da prova após transcorridas 1h30.
04. Autorizado o início, verifique se este caderno contém 40 questões e se a prova condiz com a opção escolhida.
05. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
07. Confira, na sua Folha de Respostas, todos os seus dados impressos.
08. Para marcar a Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, em nenhuma hipótese, ela será substituída.
09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo(a).
10. Não será permitido ao candidato(a) levar consigo a prova, a mesma deve ser entregue juntamente com a Folha de Respostas aos fiscais de sala.
11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusiva mente ao candidato interpretar e decidir.
12. A comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde do IMIP, deseja a todos uma boa prova.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

⇒ As questões 1 a 20 são referentes a prova Específica de SAÚDE COLETIVA.

- 1. Quais dos sistemas de informações abaixo podem ser utilizados pelas equipes de saúde para monitoramento de crianças de baixo peso?**
  - A. SIAB e SIA
  - B. SIAB e SIM
  - C. SIM e SIA
  - D. SIAB e SISVAN
  - E. SIM e SINAN
  
- 2. Qual das opções abaixo NÃO se constitui um dos atributos da atenção primária a saúde?**
  - A. Longitudinalidade
  - B. Integralidade
  - C. Coordenação do cuidado
  - D. Orientação familiar e comunitária
  - E. Fragmentação da assistência
  
- 3. O momento do planejamento onde são estabelecidas as conexões entre as causas e consequências dos problemas abordados é:**
  - A. Momento situacional
  - B. Momento normativo
  - C. Momento explicativo
  - D. Momento estratégico
  - E. Nenhuma das respostas anteriores
  
- 4. Qual o instrumento de gestão que vem sendo utilizado para monitoramento do desempenho do sistema dos serviços de saúde:**
  - A. Pacto da atenção básica
  - B. Programação pactuada integrada
  - C. Indicadores da atenção básica
  - D. Pacto de Gestão
  - E. Nenhuma das respostas anteriores
  
- 5. A Promoção da Saúde tem como um de seus componentes a Educação em Saúde. São ações de Promoção da Saúde, EXCETO:**
  - A. Reunião com grupos de hipertensos e diabéticos.
  - B. Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
  - C. Vacinação de contactantes de caso de sarampo.
  - D. Orientação à gestante quanto à amamentação.
  - E. Orientação de atividade física na Academia da Cidade.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**6. “Processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem um maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde, tornando-os aptos a analisarem sua realidade, de modo a propor alternativas que melhorem sua vida dentro do contexto e o ambiente onde eles vivem, de modo a controlar riscos e danos a sua saúde”.**

Podemos afirmar que a definição anterior retrata qual princípio da promoção de saúde:

- A. Intersetorialidade
- B. Educação em saúde
- C. Empoderamento
- D. Reorientação dos serviços de saúde
- E. Participação social

**7. No modelo de vigilância à saúde, a razão dos óbitos registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e no Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB), em um município com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, deve ser igual a:**

- A. 1
- B. >1
- C. <1
- D. 0
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

**8. Relacione a coluna abaixo com as definições que se completam:**

- 1. Controle Social
- 2. Equidade
- 3. Integralidade
- 4. Acolhimento
- 5. Intersetorialidade

( ) Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.

( ) Ações comunicacionais, ato de receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, dando respostas adequadas a cada demanda, em todo o percurso da busca (recepção, clínica, encaminhamento externo, retorno, remarcação e alta).

( ) Participação dos usuários na gestão do SUS. Seus fóruns oficiais são as Conferências e os Conselhos de Saúde.

( ) Um maior valor de financiamento das ações assistenciais para os municípios de menor IDH.

( ) Articular vários setores da sociedade em prol da melhoria da saúde da população.

Marque a alternativa **CORRETA:**

- A. 1;2;3;4;5   B. 5;3;1;4;2   C. 3;4;1;2;5   D. 4;3;1;2;5   E. 2;3;4;5;1



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**9. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO é correto afirmar:**

- A. Tem como legislação básica as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.
- B. O controle social consta como um dos seus princípios e diretrizes.
- C. Seus recursos financeiros têm fontes diversas e são depositados em conta especial (Fundos de Saúde), em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- D. Exclui a participação da iniciativa privada mesmo quando os serviços públicos são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
- E. Executa ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito

**10. O objetivo da Emenda Constitucional nº 29 foi:**

- A. Regularizar a descentralização da gestão da Atenção Primária à Saúde;
- B. Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C. Assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- D. Regularizar a regionalização da assistência à saúde;
- E. Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Nordeste.

**11. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, relativas ao controle da tuberculose, NÃO SE APLICA:**

- A. Solicitar pesquisa de BK no escarro;
- B. Buscar os sintomáticos respiratórios;
- C. Referenciar todos os casos diagnosticados de tuberculose para o serviço de referência especializado;
- D. Notificar todos os casos à Secretaria Municipal de Saúde
- E. Realizar tratamento supervisionado.

**12. NÃO se considera um dos princípios organizativos do SUS:**

- A. Participação social
- B. Centralização
- C. Comando único
- D. Regionalização
- E. Hierarquização

**13. São medidas de prevenção terciária, EXCETO:**

- A. Próteses e órteses
- B. Fisioterapia
- C. Reabilitação
- D. Terapia Ocupacional
- E. Evitar sequelas



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**14. A definição de território utilizada no processo de organização local da Estratégia Saúde da Família deve ser compreendida como:**

- A. Um espaço onde encontramos os três níveis de atenção à saúde.
- B. Um espaço dinâmico, “vivo”, em processo de construção e reconstrução.
- C. Uma área com indicadores epidemiológicos homogêneos.
- D. Uma área delimitada por características geográficas marcantes.
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

**15. Sobre as características do processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, assinale “C” nas alternativas corretas e “E” nas erradas e em seguida assinale a alternativa correta.**

- ( ) I. Promover à assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento as urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada.
- ( ) II. Planejar ações que promovam assistência apenas aos grupos de risco.
- ( ) III. Responsabilização sanitária para com os indivíduos / famílias de um determinado território definido.
- ( ) IV. Realizar planejamento em saúde sem possibilidades para readequações.
- ( ) V. Promover uma atenção integral, contínua e organizada.

Estão corretas APENAS:

- A. II, IV, V
- B. I, III, IV, V
- C. I, III, V
- D. III, IV, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

**16. Segundo a OPAS (2005), os componentes que caracterizam um Sistema de Saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) são:**

- ( ) Acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção; orientação familiar e comunitária; organização da gestão otimizadas.
- ( ) Intersetorialidade; participação; sustentabilidade; solidariedade e enfoque na doença.
- ( ) Acesso universal; territorialização; cadastramento individual; políticas e programas centralizadoras.
- ( ) Políticas e Programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos adequados; sustentáveis e ações intersetoriais com enfoques comunitários.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. V, V, F, F
- B. F, V, V, F
- C. V, F, V, F
- D. V, F, F, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**17. Constituem antecedentes históricos da Saúde Coletiva, EXCETO:**

- A. Medicina Social.
- B. Medicina Preventiva.
- C. Medicina Baseada em Evidências.
- D. Polícia Médica na Alemanha, Medicina Urbana na França e Medicina da força de trabalho na Inglaterra.
- E. Movimento da Reforma Sanitária no Brasil

**18. A frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo, denomina-se:**

- A. Morbidade.
- B. Incidência.
- C. Letalidade.
- D. Prevalência.
- E. Transmissibilidade.

**19. O Pacto pela Vida (2006) é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:**

- A. Saúde do idoso.
- B. Controle do câncer do colo de útero e da mama.
- C. Fortalecimento da atenção básica.
- D. Promoção da saúde.
- E. Redução da mortalidade por acidentes de trânsito.

**20. Considerando que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que buscam garantir a integralidade do cuidado (MS/ 2010). Assinale a alternativa ERRADA:**

- A. A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura as mulheres uma atenção humanizada à gravidez, às crianças um nascimento seguro e aos homens o acesso às unidades de saúde no terceiro turno.
- B. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
- C. São consideradas redes prioritárias pelo Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.
- D. São componentes e interface da Rede de Urgência e Emergências (RUE): SAMU 192, Atenção Domiciliar e leitos de retaguarda.
- E. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como um de seus objetivos desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

⇒ As questões 21 a 40 são referentes a prova **Específica de ENFERMAGEM**.

**21. A respeito das adaptações fisiológicas da gestação, analise as alternativas abaixo usando V – VERDADEIRO e F – FALSO e marque a sequência CORRETA.**

- ( ) A poliúria está presente na gestante devido à compressão na bexiga exercida pelo útero que provoca o aumento de capacidade da bexiga em decorrência da atonia ocasionada pelos hormônios.
- ( ) A vagina, o cérvix e a vulva, durante a gestação, podem ficar intumescidos, amolecidos e ter alteração na coloração, sendo denominado de Sinal de Chadwick.
- ( ) O hematócrito e hemoglobina encontram-se aumentados, porém em uma menor proporção que o volume plasmático, por isso ocorre a anemia fisiológica da gestação.
- ( ) O cloasma refere-se a linha vertical no abdome da gestante, resultante das alterações hormonais, e que desaparece após a gestação.
- ( ) Os Tubérculos de Montgomery são resultantes do aumento das glândulas sebáceas nos mamilos.

- a) VFVVF
- b) VVFFV
- c) VFVFF
- d) VVVVF
- e) VVVVV

**22. A estratégia Rede Cegonha, proposta pelo Ministério da Saúde, visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, bem como garantir à criança o direito ao nascimento seguro e ao desenvolvimento saudável. Sobre esse assunto, assinale a opção CORRETA com base na Portaria GM/MS n.º 1.459/2011.**

- a) Os Municípios que não possuem serviços próprios de atenção ao parto e nascimento, assim como exames especializados na gestação, poderão aderir a Rede Cegonha no componente PRÉ-NATAL desde que programados e pactuados nos Colegiados de Gestão Regional (CGR).
- b) É garantido a gestante acesso ao pré-natal de alto de risco nos serviços hospitalares e de baixo risco na unidade, porém não há compromisso de apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local em que será realizado o parto.
- c) O financiamento da estratégia é apenas do governo federal.
- d) A Rede Cegonha deve garantir atenção à saúde da criança de zero a doze meses, desde que haja necessidade da criança de acordo com a gravidade do quadro clínico apresentado.
- e) A Rede Cegonha organiza-se a partir de três (3) componentes, quais sejam: I - Pré-Natal; II - Parto e Nascimento e III – Puerpério/Atenção Integral à Saúde da Criança



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**23. Na atenção a anticoncepção da mulher, é importante a disponibilização de diferentes opções de métodos anticonceptivos para que as mulheres possam escolher o mais apropriado. Sobre esse tema assinale abaixo a opção CORRETA:**

- a) O DIU de cobre tem duração média de uso de 1 ano, resalta-se entre as suas vantagens, a diminuição do fluxo menstrual e da dismenorréia.
- b) O diafragma consiste em um anel flexível que cobre parcialmente o colo uterino, por isso indicado apenas para mulheres com baixo risco para HIV. A vida útil do diafragma é em torno de três (3) anos, no entanto após a relação sexual deve ser retirado da vagina no tempo mínimo de 3 horas.
- c) O método de Billings fundamenta-se nas alterações da temperatura basal que ocorre na mulher ao longo do ciclo menstrual.
- d) As pílulas combinadas, que são classificadas como monofásicas, bifásicas ou trifásicas, constituem o método contraceptivo hormonal mais indicado para o período de amamentação.
- e) Os anticoncepcionais hormonais orais que possuem apenas progestogênio em sua composição, contêm uma dose baixa de progestogênio, e promovem espessamento do muco cervical, o que por sua vez dificulta a penetração dos espermatozoides, sendo o mais indicado durante a lactação.

**24. O aleitamento materno apresenta diversos benefícios, tanto para mãe quando para a criança, desde aspectos emocionais até questões da prevenção de doenças, sendo ainda considerado o alimento mais completo e adequado para o bebê. No entanto, em determinadas situações, pode causar danos à saúde infantil e materna, sendo prejudicial à saúde de ambos, recomendando-se a suspensão. Diante do exposto, recomenda-se a suspensão definitiva do aleitamento materno caso de:**

- a) A mãe ser portadora do vírus da dengue.
- b) A mãe ser portadora do bacilo da hanseníase.
- c) A mãe ter sífilis.
- d) A criança seja portadora de galactosemia.
- e) A criança seja portadora do vírus da hepatite B.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**25. A evolução do trabalho de parto é variável, no entanto são reconhecidos os períodos clínicos que se fazem presentes e é indispensável identificar as necessidades da parturiente, sob o ponto de vista físico e emocional, em suas diferentes fases para proporcionar uma assistência adequada. Sobre as condições do trabalho de parto, assinale abaixo a alternativa CORRETA:**

- a) O período de dilatação é iniciado com as contrações rítmicas, regulares, intensas e dolorosas terminando com o apagamento e completa dilatação e dura no máximo 2 horas nas primíparas.
- b) Dinâmica Uterina é o numero e duração da contração ocorrida em um intervalo de 20 minutos com presença de contrações uterinas em intervalos regulares, que aumentam progressivamente com o passar do tempo.
- c) As dores do falso trabalho de parto, denominadas de contrações de Braxtonhicks, podem ser indolores, porém incômodas, e modificam ativamente o colo uterino indicando o início ativo do trabalho de parto.
- d) O mecanismo de descolamento da placenta denominado de Mecanismo de Baudelocque-Schultze ocorre em 25% dos casos, e é caracterizado pela placenta que destaca-se pela periferia e desliza para a ferida vulvar, aparecendo pela face materna.
- e) O quarto período do parto, ou Período de Greemberg, é caracterizado pela Miotamponagem, Trombotamponagem, indiferença miouterina e contração uterina fixa.

**26. O puerpério consiste no período do ciclo Gravídico-Puerperal em que as modificações locais e sistêmicas decorrentes da gravidez e do parto retornam a situação do estado pré-gravídico. Sobre este período, analise as alternativas abaixo, e assinale a sequência CORRETA.**

- ( ) As contrações uterinas no puerpério são mais intensas e de menor frequência.
- ( ) A não amamentação é um fator que interfere na regressão uterina que acontece mais lentamente.
- ( ) O aspecto dos lóquios são sanguinolentos até aproximadamente o 10º dia e após se torna seroso.
- ( ) A deambulação precoce é importante para evitar fenômenos tromboembólicos devido ao aumento das plaquetas e fatores de coagulação no período do pós-parto.
- ( ) Normalmente, a temperatura pode se elevar por dois dias do pós-parto ultrapassando os 38°C sem ser um indicativo de infecção puerperal.

- a) VVVVV
- b) VVFVF
- c) FVFFF
- d) VFVFF
- e) VVVVF



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**27. De acordo com o Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde, uma atenção qualificada ao Pré-natal e Puerpério é fundamental para a saúde da gestante e do neonato. Sobre a atenção à mulher na gestação, assinale abaixo a alternativa CORRETA:**

- a) Constitui fator de risco para a gestação atual a faixa etária da gestante entre 15 e 35 anos de idade.
- b) Durante a primeira consulta a gestante, deve ser realizado um exame físico seguido pelo exame ginecológico e obstétrico, no entanto não devendo ser realizada, nesse momento, a inspeção de colo de útero e de conteúdo vaginal, sendo preferível, de acordo com o manual, a solicitação posterior do exame preventivo do câncer de Colo Uterino.
- c) O Enfermeiro, na primeira consulta, deve estimar a Data Provável do Parto -DPP. Para isto pode ser utilizada a Regra de Nägele que consiste em calcular a DPP a partir da duração média da gestação normal, para proceder ao calculo deve-se somar sete dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair três meses ao mês em que ocorreu a última menstruação.
- d) A ausculta dos batimentos cardíacos fetais (bcf) deve ser realizada em todas as consultas para verificar a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade dos mesmos. É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre 80 a 120 batimentos por minuto.
- e) Na leitura do resultado do exame de Urina Tipo I deve-se valorizar a presença de traços de Proteínas, mesmo na ausência de sinais clínicos de pré-eclâmpsia, devendo a gestante ser imediatamente referida ao pré-natal de alto risco.

**28. A assistência de enfermagem durante uma eclâmpsia deve ser imediata e rigorosa para um bom prognóstico materno-fetal, com base nesse tipo de agravo, assinale a alternativa incorreta sobre a conduta de um profissional de Enfermagem durante a assistência a uma gestante que apresenta-se nesse quadro:**

- a) O uso do sulfato de magnésio é o mais indicado para sua profilaxia.
- b) A utilização de benzodiazepínicos pode ser necessária durante a convulsão e não ultrapassa a barreira transplacentária, por isso não é prejudicial ao feto.
- c) Durante a assistência na eclâmpsia a desobstrução de vias aéreas é fundamental para redução do risco de broncoaspiração com o uso da cânula de guedel e lateralização da cabeça, além de um aporte de oxigênio.
- d) Mais importante do que interromper uma convulsão já iniciada é a prevenção de nova crise.
- e) A recorrência da convulsão piora o prognóstico da mulher, devido a maior possibilidade de lesão cerebral.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**29. De acordo com o INCA, o câncer de Mama é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo, e o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Através do diagnóstico e tratamento precoce, o prognóstico pode se tornar relativamente bom. Sobre o câncer de mama e seu tratamento, analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA:**

- a) Atualmente indica-se a Mastectomia Total, independente do estadiamento clínico e do tipo histológico, visando evitar o ressurgimento de novas lesões teciduais;
- b) A Mastectomia Radical caracteriza-se por ser um procedimento cirúrgico onde ocorre a retirada da mama com pele e complexo aréolo-papilar;
- c) A indicação de diferentes tipos de cirurgia depende sempre do estadiamento clínico e do tipo histológico, a cirurgia para tratamento do câncer de mama pode ser conservadora quando ocorre a setorectomia, a tumorectomia alargada e a quadrantectomia, ou não-conservadora através da mastectomia;
- d) A classificação TNM - tamanho do tumor (T), comprometimento nodal (N) e metástases (M), aplica-se a todos os tipos de nódulos mamários, não sendo exclusivo para os carcinomas, dessa forma, considera-se dispensável a confirmação histológica.
- e) Apenas as mulheres com mais de 50 anos devem procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, ressalta-se que toda mulher com mais de 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos.

**30. O câncer do colo do útero é o segundo mais incidente na população feminina brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. Sobre o câncer de colo uterino, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA.**

- a) A Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) é apenas uma lesão precursora do câncer. O NIC I caracteriza-se pelo desarranjo em todas as camadas do epitélio (displasia acentuada e carcinoma in situ), sem invasão do tecido conjuntivo subjacente;
- b) A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano – HPV. Atualmente no Brasil existem 2 vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis que fornecem proteção contra os subtipos 16 e 18 do HPV.
- c) Uma vez vacinada contra o HPV, por serem vacinas eficazes contra as lesões precursoras do câncer cérvico-uterino, as mulheres que forem imunizadas para o HPV estão dispensadas do exame preventivo.
- d) As duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero dependem da origem do epitélio acometido pela lesão: caso acometa o epitélio escamoso é denominado de adenocarcinoma, por outro lado se houver comprometimento do epitélio glandular denomina-se de carcinoma epidermoide.
- e) O exame preventivo (papanicolaou ou citopatológico), que pode detectar as lesões precursoras do câncer de colo uterino, deve ser feito anualmente, apenas em mulheres com vida sexual ativa.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**31. Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) para as sentenças abaixo a respeito dos distúrbios do líquido amniótico:**

- ( ) O Polidrâmnio é o aumento excessivo do volume do líquido amniótico, superior a 2.000ml, em gestações acima de 30 semanas.
- ( ) O volume de líquido amniótico normal é entre 08 e 18 cm sendo denominado de normoidrâmnio.
- ( ) A produção de urina, a deglutição fetal e o exudato alveolar passam a ser as vias fundamentais para a mudança na composição do LA a partir do segundo trimestre.
- ( ) A osmolaridade do LA não é influenciada por fatores como hiperhidratação materna e modificações na composição da urina fetal;
- ( ) A etiologia do Polidrâmnio pode ser materna, fetal ou idiopática. Essa patologia não encontra-se associada à alterações como diabetes materno ou macrossomia fetal.

Assinale a seqüência CORRETA:

- a) FVFFV
- b) FVFVF
- c) VVVFF
- d) VVFFF
- e) VFVVF

**32. Diferencie as causas de sangramento no terceiro trimestre de gestação associando as causas abaixo listadas com a sintomatologia descrita nas sentenças:**

A - Descolamento Prematuro de Placenta  
B - Placenta Prévia

- ( ) A maioria dos casos estão associados a hipertensão arterial.
- ( ) O sangramento normalmente é rutilante e não doloroso, e surge sem causa aparente e de início e cessar súbito.
- ( ) O sangramento pode ser visível ou não, seguido de dor abdominal e hipertonia uterina.
- ( ) Na sua ocorrência é proibida a realização de toques vaginais.
- ( ) Detectada essa patologia indica-se interrupção imediata da gestação e entre as intervenções de enfermagem estão: avaliar SSVV, puncionar um acesso venoso calibroso para infusão líquidos endovenosos, instalar uma SVD para medir o debito urinário e avaliar sinais de choque e perda sanguínea.

Assinale abaixo a seqüência CORRETA:

- a) AABAA
- b) ABBAA
- c) ABABA
- d) BBAAB
- e) BAABA



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**33. A implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem-SAE/ Processo de Enfermagem é fundamental por contribuir para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, para a caracterização do corpo de conhecimentos da profissão e por trazer implicações positivas para o paciente e para equipe de enfermagem. Sobre esse tema, analise e assinale a alternativa CORRETA abaixo:**

- a) Não há resolução regulamentadora sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e implementação do Processo de Enfermagem no Brasil.
- b) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação e Avaliação de Enfermagem.
- c) O processo de enfermagem não pode ser denominado como Consulta de Enfermagem devido a sua realização em instituições de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas e associações comunitárias.
- d) Existe resolução regulamentadora sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e implementação do Processo de Enfermagem no Brasil, a mesma foi criada em 1973.
- e) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático nos serviços públicos de saúde, ficando a critério das instituições privadas optar pela sua utilização.

**34. O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde - OMS como uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. Sobre esse período analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) A menopausa é um marco dessa fase, que corresponde ao último ciclo menstrual que somente é reconhecida depois de passados 24 meses da última menstruação e acontece geralmente em torno dos 60 anos de idade.
- b) As alterações de humor relacionadas à redução de estrógenos e, conseqüentemente, de neurotransmissores como adrenalina, serotonina, opióides, entre outros.
- c) Estão presentes nessa fase: irritabilidade emocional, secura vaginal, ressecamento da pele e mucosas, maior urgência e incontinência urinária, além de fogachos e ondas de calor.
- d) A queda do estrógeno ocasiona maior risco coronariano e maior redução da massa óssea e perda na reparação do tecido ósseo.
- e) A vagina se apresenta lisa e delgada ao exame ginecológico.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**35. Segundo o Ministério da Saúde a sífilis é uma doença de fácil detecção e tratamento, porém os índices de sífilis congênita ainda estão acima dos esperados. Julgue o item incorreto sobre essa patologia:**

- a) Entre as conseqüências que esta patologia pode acarretar para o feto estão: abortamento, óbito e malformações fetais.
- b) A gestante com alergia à penicilina poderá optar pelo tratamento com o estearato de eritromicina e o feto é considerado tratado.
- c) A não adesão ao tratamento do parceiro é a grande barreira para redução da sífilis congênita.
- d) Nos recém-nascidos com exames laboratoriais não-reagentes, mas com suspeita epidemiológica, deve-se repetir os testes sorológicos após o terceiro mês pela possibilidade de positividade tardia.
- e) A sífilis em gestantes está incluída na lista de agravos de notificação compulsória.

**36. A respeito do pré-natal, de acordo com o Manual de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Gestantes com fator Rh negativo e parceiro com fator Rh positivo e/ou desconhecido: solicitar teste de Coombs indireto. Se o resultado for negativo, repeti-lo em torno da 30ª semana. Se for positivo encaminhar ao pré-natal de alto risco.
- b) O VDRL deve ser solicitado na primeira consulta e repetido por volta das 30 semanas, caso seja positivo tratar apenas a gestante no terceiro trimestre.
- c) Fora da gravidez, a dose de reforço da antitetânica deve ser administrada a cada dez anos. Em caso de nova gestação, deverá ser instituído com cinco anos.
- d) Em caso de ausência de sinais clínicos de infecção urinária com presença de leucócitos/piócitos deve-se solicitar uma urocultura e antecipar a volta para consulta de pré-natal.
- e) A gestante deve ser referida imediatamente ao pré-natal de alto risco caso o resultado da hemoglobina seja abaixo de 08 g/dl.



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**37. O atendimento imediato a uma mulher portadora de DST não é apenas uma ação curativa, deve ser considerada também uma ação preventiva da transmissão e do surgimento de outras complicações. Nesse contexto, analise os itens abaixo sobre a atenção à Saúde da Mulher portadora de DST e assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A vaginose bacteriana e a candidíase são infecções endógenas. Dessa forma é necessário que os parceiros de mulheres com esses tipos de infecção sejam tratados com o mesmo medicamento;
- b) O teste de Whiff (teste das aminas = lâmina com uma gota de KOH 0,1% sobre uma gota de conteúdo vaginal, considerando o resultado positivo se o cheiro for de peixe podre) é utilizado para diagnóstico da *Gardnerella vaginalis*.
- c) A Candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e vagina, causada por um fungo comensal que habita apenas a mucosa vaginal. A relação sexual é a principal forma de transmissão uma vez que esses organismos podem fazer parte da flora endógena das mulheres;
- d) A infecção causada pelo *Trichomonas vaginalis* (protozoário flagelado), tem como reservatório apenas a cérvix uterina e sua forma de transmissão não esta associada a atividade sexual.
- e) A vaginose bacteriana é caracterizada por um desequilíbrio da flora vaginal normal, devido ao aumento exagerado de bactérias, em especial as anaeróbias (*Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides* sp, *Mobiluncus* sp, micoplasmas, peptostreptococos), associado a uma ausência ou diminuição acentuada dos lactobacilos acidófilos.

**38. Sobre os Objetivos Específicos e Estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PAISM, julgue as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual, organizando redes integradas de atenção às mulheres em situação de violência sexual e doméstica;
- b) Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero, visando melhorar a informação sobre as mulheres portadoras de transtornos mentais no SUS;
- c) Promover a atenção à saúde da mulher negra melhorando o registro e produção de dados sobre essa população;
- d) Redução da faixa etária de realização do exame cérvico-uterino para mulheres com menos de 25 anos, devido ao risco aumentado dessa população ao Câncer de Colo de útero;
- e) Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito do SUS;



**INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**  
**Processo Seletivo da Residência em Enfermagem em Saúde da Mulher**  
**Hospital e Maternidade Petronila Campos – São Lourenço da Mata/ PE**  
**FEVEREIRO/2014**

**39. Sobre os instrumentos legais que regulamentam o exercício da Enfermagem (Resolução COFEN-311/2007 e Lei Nº 7.498/86), analise as alternativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA:**

- a) O profissional de Enfermagem é proibido de provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos previstos em Lei, nos quais o profissional através da sua subjetividade poderá decidir se participa ou não do ato.
- b) O profissional de Enfermagem deverá responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- c) É direito do profissional de Enfermagem suspender as suas atividades apenas quando a instituição privada não oferecer condições mínimas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo oferecer continuidade da assistência no ambiente público desde que comunique imediatamente sua decisão ao COREN.
- d) É privativo do Enfermeiro a direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- e) Como integrante da equipe de saúde o Enfermeiro pode realizar a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;

**40. O conceito de Biossegurança advém das palavras Vida + Segurança, as medidas de Biossegurança consistem em ações voltadas para a segurança da vida e englobam medidas que evitam riscos físicos, ergonômicos, químicos, biológicos e psicológicos. No ambiente hospitalar estão presentes diversos desses riscos, e sobre essa temática relevante para a saúde do trabalhador de saúde assinale abaixo a assertiva CORRETA:**

- a) O ensacamento de resíduos infectantes deverá ser feito em sacos plásticos, de cor preta;
- b) O lixo infectante (proveniente de material contaminado) deverá ter ensacamento duplo, até 2/3 da capacidade volumétrica, e deve ser acondicionado em sacos brancos leitosos.
- c) As superfícies fixas (pisos, paredes, tetos, portas, mobiliários e demais instalações) representam risco significativo de transmissão de infecções na área hospitalar, sendo dessa forma necessária a desinfecção rotineira dessas superfícies em todo ambiente hospitalar, independente da existência de depósito ou respingo de matéria orgânica
- d) O lixo infectante deverá ter ensacamento duplo, até a metade da capacidade volumétrica e deve ser acondicionado em sacos brancos leitosos e impermeáveis
- e) Artigos são instrumentos utilizados e manuseados nos serviços de saúde, de natureza diversa, e podem ser classificados em: artigos críticos, que são aqueles que penetram através da pele e mucosas; Artigos semi-críticos, os que têm contato com a pele ou mucosas íntegras (endoscópios, laringoscópios, entre outros); e Artigos não críticos que têm contato com a solução de continuidade da pele.