



Processo Seletivo
Residência Multiprofissional e em
Área Profissional em Saúde 2014

CADERNO DE PROVA

Dia: 02 de fevereiro de 2014

Prova : **9-Cirurgião Dentista - Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/Cuidados Paliativos**

Leia com atenção:

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e, quando for autorizado pelos fiscais de sala.
02. Confira seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. A prova terá duração de 3 horas; O(a) candidato(a) só poderá ausentar-se da prova após transcorridas 1h30.
04. Autorizado o início, verifique se este caderno contém 40 questões e se a prova condiz com a opção escolhida.
05. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
07. Confira, na sua Folha de Respostas, todos os seus dados impressos.
08. Para marcar a Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, em nenhuma hipótese, ela será substituída.
09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo(a).
10. Não será permitido ao candidato(a) levar consigo a prova, a mesma deve ser entregue juntamente com a Folha de Respostas aos fiscais de sala.
11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
12. A comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde do IMIP, deseja a todos uma boa prova.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

⇒ As questões 1 a 20 são referentes a prova Específica de SAÚDE COLETIVA.

1. Quais dos sistemas de informações abaixo podem ser utilizados pelas equipes de saúde para monitoramento de crianças de baixo peso?

- A. SIAB e SIA
- B. SIAB e SIM
- C. SIM e SIA
- D. SIAB e SISVAN
- E. SIM e SINAN

2. Qual das opções abaixo não se constitui um dos atributos da atenção primária a saúde?

- A. Longitudinalidade
- B. Integralidade
- C. Coordenação do cuidado
- D. Orientação familiar e comunitária
- E. Fragmentação da assistência

3. O momento do planejamento onde são estabelecidas as conexões entre as causas e consequências dos problemas abordados é:

- A. Momento situacional
- B. Momento normativo
- C. Momento explicativo
- D. Momento estratégico
- E. Nenhuma das respostas anteriores

4. Qual o instrumento de gestão que vem sendo utilizado para monitoramento do desempenho do sistema dos serviços de saúde:

- A. Pacto da atenção básica
- B. Programação pactuada integrada
- C. Indicadores da atenção básica
- D. Pacto de Gestão
- E. Nenhuma das respostas anteriores

5. A Promoção da Saúde tem como um de seus componentes a Educação em Saúde. São ações de Promoção da Saúde, EXCETO:

- A. Reunião com grupos de hipertensos e diabéticos.
- B. Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
- C. Vacinação de contactantes de caso de sarampo.
- D. Orientação à gestante quanto à amamentação.
- E. Orientação de atividade física na Academia da Cidade.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

6. “Processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem um maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde, tornando-os aptos a analisarem sua realidade, de modo a propor alternativas que melhorem sua vida dentro do contexto e o ambiente onde eles vivem, de modo a controlar riscos e danos a sua saúde”.

Podemos afirmar que a definição anterior retrata qual princípio da promoção de saúde:

- A. Intersetorialidade
- B. Educação em saúde
- C. Empoderamento
- D. Reorientação dos serviços de saúde
- E. Participação social

7. No modelo de vigilância à saúde, a razão dos óbitos registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e no Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB), em um município com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, deve ser igual a:

- A. 1
- B. >1
- C. <1
- D. 0
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

8. Relacione a coluna abaixo com as definições que se completam:

- 1. Controle Social
- 2. Equidade
- 3. Integralidade
- 4. Acolhimento
- 5. Intersetorialidade

() Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.

() Ações comunicacionais, ato de receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, dando respostas adequadas a cada demanda, em todo o percurso da busca (recepção, clínica, encaminhamento externo, retorno, remarcação e alta).

() Participação dos usuários na gestão do SUS. Seus fóruns oficiais são as Conferências e os Conselhos de Saúde.

() Um maior valor de financiamento das ações assistenciais para os municípios de menor IDH.

() Articular vários setores da sociedade em prol da melhoria da saúde da população.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. 1;2;3;4;5 B. 5;3;1;4;2 C. 3;4;1;2;5 D. 4;3;1;2;5 E. 2;3;4;5;1



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

9. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO é correto afirmar:

- A. Tem como legislação básica as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.
- B. O controle social consta como um dos seus princípios e diretrizes.
- C. Seus recursos financeiros têm fontes diversas e são depositados em conta especial (Fundos de Saúde), em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- D. Exclui a participação da iniciativa privada mesmo quando os serviços públicos são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
- E. Executa ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito

10. O objetivo da Emenda Constitucional nº 29 foi:

- A. Regular a descentralização da gestão da Atenção Primária à Saúde;
- B. Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C. Assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- D. Regular a regionalização da assistência à saúde;
- E. Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Nordeste.

11. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, relativas ao controle da tuberculose, NÃO SE APLICA:

- A. Solicitar pesquisa de BK no escarro;
- B. Buscar os sintomáticos respiratórios;
- C. Referenciar todos os casos diagnosticados de tuberculose para o serviço de referência especializado;
- D. Notificar todos os casos à Secretaria Municipal de Saúde
- E. Realizar tratamento supervisionado.

12. NÃO se considera um dos princípios organizativos do SUS:

- A. Participação social
- B. Centralização
- C. Comando único
- D. Regionalização
- E. Hierarquização

13. São medidas de prevenção terciária, EXCETO:

- A. Próteses e órteses
- B. Fisioterapia
- C. Reabilitação
- D. Terapia Ocupacional
- E. Evitar sequelas



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos

Categoria Profissional: ODONTOLOGIA

FEVEREIRO/2014

14. A definição de território utilizada no processo de organização local da Estratégia Saúde da Família deve ser compreendida como:

- A. Um espaço onde encontramos os três níveis de atenção à saúde.
- B. Um espaço dinâmico, “vivo”, em processo de construção e reconstrução.
- C. Uma área com indicadores epidemiológicos homogêneos.
- D. Uma área delimitada por características geográficas marcantes.
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

15. Sobre as características do processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, assinale “C” nas alternativas corretas e “E” nas erradas e em seguida assinale a alternativa correta.

- () I. Promover à assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento as urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada.
- () II. Planejar ações que promovam assistência apenas aos grupos de risco.
- () III. Responsabilização sanitária para com os indivíduos / famílias de um determinado território definido.
- () IV. Realizar planejamento em saúde sem possibilidades para readequações.
- () V. Promover uma atenção integral, contínua e organizada.

Estão CORRETAS apenas:

- A. II, IV, V
- B. I, III, IV, V
- C. I, III, V
- D. III, IV, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

16. Segundo a OPAS (2005), os componentes que caracterizam um Sistema de Saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) são:

- () Acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção; orientação familiar e comunitária; organização da gestão otimizadas.
- () Intersetorialidade; participação; sustentabilidade; solidariedade e enfoque na doença.
- () Acesso universal; territorialização; cadastramento individual; políticas e programas centralizadoras.
- () Políticas e Programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos adequados; sustentáveis e ações intersetoriais com enfoques comunitários.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. V, V, F, F
- B. F, V, V, F
- C. V, F, V, F
- D. V, F, F, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

17. Constituem antecedentes históricos da Saúde Coletiva, EXCETO:

- A. Medicina Social.
- B. Medicina Preventiva.
- C. Medicina Baseada em Evidências.
- D. Polícia Médica na Alemanha, Medicina Urbana na França e Medicina da força de trabalho na Inglaterra.
- E. Movimento da Reforma Sanitária no Brasil

18. A frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo, denomina-se:

- A. Morbidade.
- B. Incidência.
- C. Letalidade.
- D. Prevalência.
- E. Transmissibilidade.

19. O Pacto pela Vida (2006) é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:

- A. Saúde do idoso.
- B. Controle do câncer do colo de útero e da mama.
- C. Fortalecimento da atenção básica.
- D. Promoção da saúde.
- E. Redução da mortalidade por acidentes de trânsito.

20. Considerando que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que buscam garantir a integralidade do cuidado (MS/ 2010). Assinale a alternativa ERRADA:

- A. A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura as mulheres uma atenção humanizada à gravidez, às crianças um nascimento seguro e aos homens o acesso às unidades de saúde no terceiro turno.
- B. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
- C. São consideradas redes prioritárias pelo Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.
- D. São componentes e interface da Rede de Urgência e Emergências (RUE): SAMU 192, Atenção Domiciliar e leitos de retaguarda.
- E. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como um de seus objetivos desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos

Categoria Profissional: ODONTOLOGIA

FEVEREIRO/2014

⇒ **As questões 21 a 40 são referentes a prova Específica de Odontologia.**

21. Assinale a alternativa CORRETA de acordo com cuidados paliativos:

- I. É indicado para qualquer doença ativa, progressiva e ameaçadora à vida em diferentes fases de progressão.
 - II. Devem ser iniciados o mais precocemente possível juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia e radioterapia.
 - III. Incluem todas as investigações necessárias para melhorar a compreensão e manejo dos sintomas.
- a) Somente as alternativas I e II estão corretas.
 - b) Somente as alternativas I e III estão corretas.
 - c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
 - d) Todas as alternativas estão corretas.
 - e) NDA.

22. São princípios dos cuidados paliativos EXCETO:

- a) Promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes;
- b) Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural;
- c) Não pretender antecipar nem postergar a morte;
- d) Integrar aspectos psicossociais e espirituais aos cuidados;
- e) Oferecer um sistema de suporte ao paciente sem preocupação com a família e entes queridos para se sentirem amparados.

23. Doentes com câncer avançado são susceptíveis a infecções oportunistas na cavidade bucal e na orofaringe devido à diminuição do fluxo salivar aliada à imunossupressão provocada pelo tratamento oncológico ou pelo estado debilitante dos doentes sendo a mais comum:

- a) Herpes simples
- b) Candidíase
- c) Mucosite
- d) Xerostomia
- e) Herpes Zoster



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

24. Pacientes em cuidados paliativos apresentam sérias restrições funcionais e grande comprometimento das funções bucais, particularmente quando a doença atinge a cavidade bucal. Nessa condição, os sintomas habituais agravam-se e nem sempre são curáveis, necessitando de atenção e cuidados especiais. São sintomas bucais frequentes, EXCETO:

- a) Sangramento
- b) Infecções oportunistas
- c) Xerostomia
- d) Disfagia
- e) Síndrome da ardência bucal

25. O hemograma é um dos exames mais solicitados no laboratório clínico, pois fornece dados valiosos e esclarecedores no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. Sua totalidade contempla a análise da série vermelha, série branca e contagem geral de plaquetas. É INCORRETO afirmar sobre esse exame complementar que:

- a) Como exame complementar, o hemograma pode ser concludente ou excludente de uma hipótese diagnóstica, poucas vezes é um determinante de uma situação anormal
- b) O hemograma indica apenas as alterações dos desvios de normalidade, mas não pode indicar o local onde ocorre o distúrbio que provoca as alterações, por isso é inespecífico.
- c) O hematócrito (Ht) é o volume total das hemácias em 1000ml de sangue.
- d) Considera-se normal o número global de leucócitos circulantes de 4000 a 1000 células por mm^3 .
- e) A quantidade de plaquetas considerada normal em 1mm^3 de sangue periférico é de 150.000 a 300.000.

26. De acordo com leucograma é CORRETO afirmar que:

- I. A leucocitose é uma resposta da medula óssea a uma série de agentes que chamamos de granulocitogénicos e linfocitogénicos.
 - II. As leucopenias estão associadas à insuficiência medular, ocasião em que há redução da proliferação e maturação dos granulócitos da medula óssea.
 - III. A leucocitose pode ser resultante de proliferação de células brancas imaturas precursoras e indiferenciadas, dando origem às chamadas leucemias.
- a) Somente a alternativa I está correta
 - b) Somente a alternativa I está incorreta
 - c) Somente as alternativas I e II estão corretas
 - d) Todas as alternativas estão corretas
 - e) Todas as alternativas estão incorretas.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

27. Quando abordamos a odontologia hospitalar, observamos a sua complexidade e conseqüentemente somos levados a refletir sobre a importância da equipe multidisciplinar e da interdisciplinaridade. Assim é INCORRETO afirmar que:

- a) A multidisciplinaridade é um conjunto de disciplinas a serem trabalhadas simultaneamente sem fazer aparecer às relações que possam existir entre elas, destinando-se a um sistema de um só nível e objetivos únicos, sem cooperação.
- b) A interdisciplinaridade é a tentativa de estabelecer relações entre as disciplinas.
- c) A multidisciplinaridade é considerada uma estratégia que orienta e possibilita a realização da assistência integral. Erroneamente, confunde-se com interdisciplinaridade
- d) Interdisciplinaridade retrata a justaposição de diversas disciplinas e cada profissional atuará de acordo com seu saber especializado; processo terapêutico é fragmentado.
- e) A odontologia hospitalar trabalha na interface da interdisciplinaridade com outras profissões da área de saúde em tempo integral, atendendo previamente ao paciente ou intervindo de maneira específica durante a internação, podendo reduzir o tempo permanência no ambiente hospitalar.

28. O cirurgião-dentista tem papel fundamental junto à equipe multidisciplinar no atendimento de pacientes oncológicos. Desta forma, é importante o conhecimento de todos os efeitos colaterais que possam surgir na boca, sejam estes agudos ou crônicos, entre eles estão:

- a) Mucosite, xerostomia, candidíase
- b) Leucoplasia, mucosite, xerostomia
- c) Mucosite, xerostomia, líquen
- d) Osteorradionecrose, mucosite, leucoplasia
- e) Granuloma piogênico, osteorradionecrose, mucosite

29. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os cuidados dos pacientes em UTIs:

- a) A cavidade bucal é a primeira porta de entrada para microorganismos patogênicos respiratórios que causam infecções sistêmicas, sendo a pneumonia uma delas
- b) A pneumonia nosocomial exige atenção especial. É a segunda causa de infecção hospitalar e a responsável por taxas significativas de morbidade e mortalidade em pacientes de todas as idades.
- c) Engloba de 10% a 15% das infecções hospitalares, sendo que de 20% a 50% dos pacientes afetados por esse tipo de pneumonia chegam ao óbito.
- d) A impossibilidade do autocuidado favorece a precariedade da higienização bucal, acarretando o desequilíbrio da microbiota residente, com conseqüente a possibilidade de aquisição de diversas doenças infecciosas comprometendo a saúde integral do paciente.
- e) Os pacientes menos susceptíveis a pneumonia nosocomial são os internados em UTIs, em especial os com ventilação mecânica.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

30. De acordo com o papel do dentista na UTI é INCORRETO afirmar que:

- a) Revisões sistemáticas mostram que essa prática ainda é escassa.
- b) A presença da placa bacteriana na boca pode influenciar as terapêuticas médicas.
- c) Sabe-se que os cuidados bucais, quando realizados adequadamente, reduzem muito o aparecimento de pneumonia associada ao uso de ventilação artificial, nos pacientes em UTI.
- d) Entende-se como solução antimicrobiana oral o gluconato de clorexidina a 0,12% não é indicada para os pacientes em UTIs.
- e) Se o paciente intubado não receber higiene bucal eficaz, o tártaro dentário, formado por depósitos sólidos de bactérias, se estabelece dentro de 72 horas. Isso é seguido de gengivite emergente, inflamação das gengivas, infecção e subsequente mudança de Streptococcus e Actinomyces para um número crescente de bacilos gram-negativos aeróbicos.

31. Paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, consciente, encontra-se acamada em leito de um hospital, sob cuidados paliativos. A equipe de odontologia foi avisada pela enfermeira de plantão que a paciente estava com dor em elemento dentário posterior, intensa e pulsátil há dois dias e que o uso de analgésicos não era suficiente para debelar os sintomas. A cirurgiã-dentista, ao realizar o exame clínico, deparou-se com a necessidade de abertura coronária do elemento 36. No entanto, sabendo-se que a paciente não era alérgica a qualquer tipo de medicação, administrou antibiótico para prevenção de endocardite bacteriana uma hora antes do procedimento. Marque a alternativa que apresenta a doença que justifica a conduta da profissional, a medicação de escolha e a dosagem correta da profilaxia antibiótica, segundo as recomendações da American Heart Association:

- a) Prolapso de valva mitral sem regurgitação valvar, Amoxicilina, 2g, via oral.
- b) Febre reumática prévia sem disfunção valvar, Amoxicilina, 2g via oral.
- c) Sopros inocentes, Amoxicilina, 50mg/Kg/dia, via oral.
- d) Cardiomiopatia hipertrófica, 2g de Amoxicilina, via oral.
- e) Defeito de septo atrial, 2g de Azitromicina, via oral.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

32. Para a realização de procedimentos odontológicos invasivos, os pacientes com comprometimento cardíaco são classificados pela American Heart Association como baixo, médio e alto risco para endocardite bacteriana. Sobre a profilaxia antibiótica em pacientes cardiopatas, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|-----------------|---|
| (1) Baixo risco | () cardiopatia congênita cianótica complexa |
| | () sopro inocente |
| (2) Médio risco | () cardiopatias congênitas acianóticas |
| (3) Alto risco | () história pregressa de endocardite |
| | () Febre reumática com disfunção valvar |

A alternativa que corresponde à sequência CORRETA é:

- a) 2 1 3 3 2
- b) 2 1 3 2 2
- c) 3 1 2 3 3
- d) 3 1 2 3 2
- e) 3 1 2 2 3

33. A hemostasia é um processo complexo que envolve numerosos eventos fisiológicos. Com base na história, nos exames clínicos e de laboratório, os pacientes podem ser agrupados em três categorias: baixo, moderado e alto risco. Em procedimentos odontológicos realizados em pacientes com discrasias sanguíneas, alguns cuidados são recomendados para evitar complicações, EXCETO:

- a) A aspirina e seus derivados devem ser contra-indicados em função de sua atividade inibitória da agregação plaquetária, deve-se optar pelo paracetamol ou dipirona no controle da dor.
- b) Nas técnicas anestésicas infiltrativas, não há necessidade de reposição prévia dos fatores da coagulação.
- c) Com relação à técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, recomenda-se reposição prévia dos fatores da coagulação, devido a possibilidade de sangramento na região retromolar, com presença de trismo e risco de asfixia..
- d) Ao realizar radiografia periapical, recomenda-se proteger as bordas da película, principalmente em região mandibular (intensa vascularização do assoalho bucal)
- e) Algumas restrições são relevantes quanto ao uso de anestésicos locais com vasoconstrictor, especialmente a epinefrina.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos

Categoria Profissional: ODONTOLOGIA

FEVEREIRO/2014

34. Complete CORRETAMENTE as frases abaixo:

- Antiplaquetários interferem na _____, o que explica a atividade antitrombótica;
 - Anticoagulantes compreendem _____ e anticoagulantes orais;
 - Em casos de sangramento excessivo, usa-se hemostáticos sistêmicos ou orais, dentre eles estão a protamina e a _____.
- a) vasoconstrição; vitamina K; heparina.
- b) vasodilatação; vitamina D; lidocaína.
- c) agregação plaquetária; heparina; vitamina K.
- d) agregação plaquetária; vitamina K; heparina.
- e) vasoconstrição; lidocaína; vitamina D.

35. Sobre o atendimento odontológico ao paciente com diabetes melitus, é CORRETO afirmar:

- a) Deve-se evitar o atendimento odontológico pela manhã, dando-se preferência aos horários noturnos.
- b) O uso de vasoconstrictores do grupo das catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) deve ser evitado em diabéticos descompensados ou instáveis por apresentarem um efeito farmacológico oposto ao da insulina.
- c) Nos casos em que houver necessidade do uso de antiinflamatórios não esteróides, recomenda-se o Ácido Acetil Salicílico (AAS).
- d) No que concerne aos antibióticos, a prescrição deve ser feita nos tratamentos odontológicos que podem provocar bacteremia significativas. Pode-se utilizar as penicilinas, mas as cefalosporinas estão contra-indicadas.
- e) A hiperglicemia é uma reação adversa muito frequente durante o atendimento odontológico a pacientes com diabetes melitus, sendo os principais sinais e sintomas são fraqueza, palpitações, sudorese, fome, nervosismo, cefaléia, confusão mental e perturbações visuais



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

36. Com o aumento da população idosa, os diversos profissionais da área da saúde devem estar atentos às condições físicas, sociais e psíquicas bem diferenciadas, que demandam uma atenção diversificada. Sobre as mudanças e particularidades presentes na fisiologia do organismo da pessoa idosa, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As fraturas e as suas complicações são as principais manifestações clínicas da osteoporose.
- b) Devido à redução das secreções e enzimas digestivas há uma digestão deficiente, mas o idoso total ou parcialmente edentado pode ter essa função melhorada.
- c) A função imune pode sofrer uma perda, comprometendo a resistência às infecções.
- d) Dentre as doenças mentais, a doença de Alzheimer é um dos tipos mais comuns, sendo caracterizada pela acentuada perda de memória, acompanhada de graves manifestações psicológicas, como a alienação.
- e) A gripe, infecção causada pelo vírus influenza, oferece uma alta morbidade e mortalidade aos idosos, especialmente em pacientes com doenças crônicas, como pulmonares, cardiovasculares e diabetes.

37. Pacientes com nefropatias apresentam um alto índice de alterações sistêmicas, e a presença de dano renal afeta significativamente o diagnóstico e a conduta terapêutica. A cerca dos pacientes com nefropatias, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Pacientes com insuficiência renal crônica apresentam, frequentemente, anemia e tempo de sangramento (TS) prolongado, embora, habitualmente, a contagem de plaquetas, tempo de protrombina (TP) e o tempo de tromboplastina parcial (TTP) se apresentem dentro dos valores normais.
- b) Os anestésicos locais devem ser utilizados com cautela nos pacientes com insuficiência renal crônica e alguns são contra-indicados, como a lidocaína, por exemplo, devido à sua metabolização hepática.
- c) Em pacientes com insuficiência renal crônica, o ajuste das doses dos antibióticos que se excretam pela urina pode realizar-se por meio do aumento dos intervalos entre as doses terapêuticas usuais ou através da variação das doses. Amoxicilina, eritromicina, clindamicina e o metronidazol podem ser usados com precaução.
- d) Algumas afecções bucais e dentárias são muito frequentes no paciente com insuficiência renal crônica, como a palidez da mucosa oral, devido à anemia, a hipoplasia de esmalte dentário, o acúmulo de cálculo dentário e a gengivite.
- e) Pacientes transplantados que fazem uso de Azatioprina podem apresentar candidíase, e a Ciclosporina pode induzir a uma hiperplasia gengiva.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ODONTOLOGIA
FEVEREIRO/2014

38. Que alterações podem ser encontradas nos exames laboratoriais de um paciente com nefropatia grave:

- () Aumento dos níveis sanguíneos de uréia, creatinina e ácido úrico;
 - () Distúrbios dos níveis de sódio, potássio, cálcio, fósforo, glicose e lipídios;
 - () Diminuição da filtração glomerular;
-
- a) FFV;
 - b) FFF;
 - c) VVV;
 - d) VFF;
 - e) VFV

39. Pacientes sistemicamente comprometidos parecem ser mais suscetíveis a complicações sistêmicas ao invés da infecção odontogênica apenas local, com uma necessidade de maior permanência hospitalar e com um risco aumentado de complicações fatais. Com relação a essa afirmação, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As infecções odontogênicas graves apresentam como sintomas mais comuns o edema, dor no assoalho da boca, febre, disfagia, trismo, odontalgia, além de dificuldade respiratória e cianose, como colapso das vias aéreas.
- b) O aumento de volume de consistência dura pode ser observado em casos de abscessos confinados, celulite difusa e abscessos localizados em compartimentos anatômicos superficiais.
- c) Deve-se estar atento aos sintomas como dor torácica, angústia respiratória e dispnéia, mas, nesses casos, há risco de envolvimento do mediastino.
- d) A penicilina continua a ser o antibiótico de escolha para o tratamento das infecções odontogênicas mais simples
- e) Em pacientes graves hospitalizados com infecções odontogênicas complexas, a cobertura anaeróbia com clindamicina ou metronidazol pode ser prescrita.

40. Dentre as complicações de um abscesso dento-alveolar, podemos citar:

- () Disseminação da infecção para o tecido mole – osteomielite;
 - () Disseminação da infecção para o osso – celulite;
 - () Perda do dente.
-
- a) VVV
 - b) FFV
 - c) FVV
 - d) VFV
 - e) FFF